

而被白色細菌所包，此非危害種子之病，與發芽無關。種子之發芽與採種時果實是否已黃熟，及採種後保存法是否合宜關係最大。

(二) 幼苗苗床溫度過高時，在根頸部易被菌類侵害，而成「頸腐病」，嚴重時整株死亡。可用千分之一「谷仁樂生」灑於根頸之土壤上，以防止其蔓延。並應注意排水。(朱長志)

腰果不適育苗移植 無霜地區可以試植

【問】：(一) 介壽果(腰果) 品種共有幾種？(二) 在臺南地區是否適合種植？(三) 臺南地區何時育苗？何時定植？每公頃可種幾株？

【答】：(一) 介壽果(腰果) 品種共有幾種？(二) 在臺南地區是否適合種植？(三) 臺南地區何時育苗？何時定植？每公頃可種幾株？

【問】：(一) 介壽果(腰果) 品種共有幾種？(二) 在臺南地區是否適合種植？(三) 臺南地區何時育苗？何時定植？每公頃可種幾株？

【問】：(一) 介壽果(腰果) 品種共有幾種？(二) 在臺南地區是否適合種植？(三) 臺南地區何時育苗？何時定植？每公頃可種幾株？

【問】：(一) 介壽果(腰果) 品種共有幾種？(二) 在臺南地區是否適合種植？(三) 臺南地區何時育苗？何時定植？每公頃可種幾株？

【問】：(一) 介壽果(腰果) 品種共有幾種？(二) 在臺南地區是否適合種植？(三) 臺南地區何時育苗？何時定植？每公頃可種幾株？

【問】：(一) 介壽果(腰果) 品種共有幾種？(二) 在臺南地區是否適合種植？(三) 臺南地區何時育苗？何時定植？每公頃可種幾株？

【問】：(一) 介壽果(腰果) 品種共有幾種？(二) 在臺南地區是否適合種植？(三) 臺南地區何時育苗？何時定植？每公頃可種幾株？

【問】：(一) 介壽果(腰果) 品種共有幾種？(二) 在臺南地區是否適合種植？(三) 臺南地區何時育苗？何時定植？每公頃可種幾株？

【問】：(一) 介壽果(腰果) 品種共有幾種？(二) 在臺南地區是否適合種植？(三) 臺南地區何時育苗？何時定植？每公頃可種幾株？

(目前尚無專門腰果栽培書可供參考。)

盧金剛鳳梨橙不同青 五年生結果才有價值

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

【問】：(一) 盧金剛與鳳梨橙之管理方法如何？

橫榔八、九月間採種 春秋均可播種移植

【問】：(一) 橫榔留種至何程度可採種？(二) 播種及管理方法如何？(三) 何時栽種？是否選擇土壤？(南投縣中寮鄉和興村二二號林蘭珍)

這是植物的生命源

各位農友，這幾年來常見水稻及各種農作物、果樹、茶樹、蔬菜等，黃萎萎不開根，不長大之情形，這種病用水銀劑西藥生石灰大生等各種殺菌劑均無法見效，施之反而更加萎縮，甚至致死(水稻常被誤認為稻熱病)這是土壤中缺乏活性錳與銅之原因，這是因連作致使土壤質退化無力，植物不能正常發育，身體虛弱，發根不良，生長點萎小，一遇久旱、久熱、久雨、久旱等天氣不順時即發生這種情形，對農業影響至鉅，其與與銅之成份用普通無機質錳與銅是效果極少，必須使用有機質成份才有顯效。

這是連作地的救星

連作害開根素是有機錳與有機銅為成份，本品對植物之一生均可使用，平常用之可減少病害，生長迅速，增收效果極大。

用法如下(本品內已含浸透性展着劑故不必再加)

①可溶於一仟一三仟倍水向葉面噴射，亦可滲農藥同時噴射。
②可溶於二〇或西藥生石灰撒粉，每分地五十瓦。
③可溶於地下施肥每分地一百一二十瓦。
④可溶於種子同時播種，使用量對種子之五仟分之一。
⑤對洋蒜木耳請溶水伍仟一壹萬倍噴射。

天力化學工業股份有限公司

臺北縣中和鄉景平路47之2號
電話九二三一·一郵政劃撥五一七九
四十五瓦裝批價十五元
三〇〇瓦裝批價八十五元

日本花王石鹼株式會社出品之浸透性展着劑

美國杜邦公司出品
DUPONOL
ドゥボンール
SPRAITIN
スピレチン
SYSTEMIN
システミン
EMULMIN
エマルミン

展着劑 請用

(55)