

建|造|肉|鷄|舍

應注意二十事項

■林振衣 ■

建造肉鷄舍應力
求經濟、堅固、耐用
，而且所生產的肉鷄
品質優良，能受市場
歡迎。
下：現在分別說明如

(一) 育成鷄的

換氣和通風應良好

以上。如果空氣不夠，室內溫度即增高鷄隻食慾減退，眼睛浮腫，或流鼻涕，消瘦，疾病叢生，死亡率增加。

(二) 育成舍應保持冬天溫暖，夏天涼快

如果冬天氣候過份寒冷，鷄隻為維持體溫，必需消耗大量的熱量，以致飼料利用效率降低，生長遲鈍。夏天溫度過高，又會引起鷄隻食慾減退，飼料採食量減少，無法充分供給生長鷄肉的要求，發育就自然緩慢。因此我們建造肉鷄育成舍，必需講究夏天涼快（最高室溫不超過攝氏三十度），冬天溫暖（保持室內溫度不低於攝氏五度）。

(三) 每隻肉鷄應按日齡給與

肉鷄舍內應防止老鼠、貓、狗和其他野獸的侵害。

(八) 防止野獸侵害

因為肉鷄要在很短的時間內育成出售，以所應有安靜的環境供其充分休息，不得有噪音或噪音使其發生恐懼。

每隻肉鷄所需要的飼槽位置為七・五公分
。水槽位置為二・五公分。

(七) 避免爆音或噪音

床地潮濕時，容易發生各種傳染病。又如羽毛污染糞便，會影響外表而失去商品價值。再者，床地潮濕容易使鷄隻的腳和腹部受涼，引起消化不良、下痢或感冒等疾病。

(六) 應準備充分的給餌、給水位置

不穩定的鐵絲網床地和床架，容易發生胸部水疱和胸腫，損失商品價值。


(五) 床地應保持乾燥

為生產優良肉鷄，生期長間必需給與適當的運動，使得筋肉和內臟充分發育。茲將各週齡鷄所需要的速度面積列舉如附表。

(四) 避免使用不穩定的鐵絲網

床地或竹木床地

臺灣雜糧作物品種圖說徵求記



本社代售臺灣雜糧作物品種圖

說一書，早已售完，現在農復會考
慮增訂重印。本刊讀者如有需要這
本書的，請用郵明信片，寫明本
人姓名住址及需要部數，寄「臺北
市郵政信箱廿九號乙」。來信請在
今年七月卅一日以前寄出。

四次。又構造過於複雜，每次使用後需改造補修或水洗、消毒等，即容易發生損傷者，不宜做為肉鷄舍。

(九) 可耐連續反覆使用

肉鷄的生產設備，最少需耐於一年間反覆使用無論任何人能操作為原則。

(十) 構造簡單，使用方便

肉鷄的生產設備，在一年間必需反覆使用四次以上，每次使用前後都必需徹底消毒，尤以使用過久的老鷄舍，如果消毒不徹底，肉鷄的育成率一定一次不如一次的降低，病鷄增加，鷄羣發育也遲鈍。因此，所有設備都應力求消毒容易而完全。

(十一) 一個人可以大量飼養

飼養肉鷄以大量生產為原則，所以，設備應力求管理操作方便而省力，一個人就能大量飼養為原

電熱溫床 箱型	傘型 (平面飼養)	週齡	育雛器種類		備註
			床地面積 1 m ² 時 (隻)	每隻 (平方尺)	
一 一 四	十三 一 六	一一 三	七五 — 一〇〇	〇·一 — 一〇·〇九	
一 一 四	一 一 四	一一 三	三五 — 一〇〇	〇·二 — 六一〇·一八	
一 一 四	九 一 二	六 — 一 二	一八 — 一〇	〇·五 — 五〇—〇·三八	
一 一 四	五 一 八	一 一 六	一五隻以下 — 四五	〇·六 — 五	給溫中指溫室的床地 面積
一 一 四	二 一 五〇— 一〇〇	一 一 八	一八 — 一〇	一·〇 — 一〇	指保溫傘的面積
同 右	溫 室 床 地 面 積				育成期間床地面積

② 夏天應減少飼養二成，冬天可增加二成。

附註：① 箱型和電熱溫床，五週以後移至巴大利飼養者，以巴大利床地面積為準。又移平面者，

亞洲化學股份有限公司
嘉泰企業股份有限公司
公司：臺北市中正路1140號之4(二樓)
電話：45815號
工廠：臺北縣中和鄉四十張
電話：92-2430號

請用：

■萬靈松乳劑 二、三化螟蟲
神藥低毒速效

登記證859號

■美稻松乳劑 三、水稻害蟲
綜合殺蟲劑

登記證888號

■菜王乳劑 低毒速效
蔬菜特效藥

登記證872號

■加收成 5% 水懸粉
紋枯病殺星

登記證830號



品質最優

成分正確