

式面平·籠絲鐵·利大巴

弊和利的式方鷄養種三

·衣 振 林·

目前本省的養鷄方式，大部份採用大巴利和鐵絲籠室兩種方法飼養，有少部份採用歐美式的平面飼養法，但是這種方式，都各有利弊，本篇是檢討它們的得失，供養鷄業者按環境不同，自行選擇。

大巴利和籠式飼養

大巴利和籠式飼養事實上有很多缺點，分析如下：

(1) 雛鷄的育成期間需分兩三個階段移動：自保溫箱遷移中鷄室後，自遷移大鷄室才能育成出售。這樣一來每次移動都會損傷肉鷄，且生活環境變化，正常的發育也就停滯兩三天，這期間白白吃飼料，導致飼料效率降低。

(2) 運動受限制，結果妨礙了內臟和筋肉的健全發育，致胸部狹小，肌肉不結實且軟弱，龍骨容易發生彎曲，影響屠體的外貌和商品價值。又在此大巴利或鐵絲籠所育成的肉鷄輸送中體重損耗顯著，如經過二、三個小時的輸送，體重會減輕百分之五以上。

(3) 埭地因大部份採用鐵絲籠，致構造不穩定，又接觸飼槽、水槽及隔室等鐵絲或木竹條機會繁多，肉鷄胸部容易發生水腫或腫瘍，失去商品價值。

(4) 大巴利和鐵絲籠室構造複雜

，每次使用需加補修，而且實施完全消毒也有困難。

(5) 由於大巴利方式飼養在狹小的地方以層疊數層鷄室，致換氣不良，容易發生呼吸系統的疾病。

(6) 移動雛鷄、掃除糞便、給飼、給水等需較多的勞力和時間，因此無法大量生產。

(7) 發育不整齊：採用大巴利和鐵絲籠室飼養其鷄羣的管理，無論多麼合乎理想，每羣室總是會出現發育較差的鷄隻，或容易發生破脚鷄隻。

相反，它們也有三個很大的優點如次：
(1) 可以採用連續性的生產：大巴利育雛器的每臺收容數可以當做一次的入雛數量，也就是一次的生產數量，所以準備五百隻收容量的育雛器四臺，

大信牌農藥

應各界農民備用，產品項目大量增加！

最新水稻蔬菜殺蟲劑

富米靈 登記證900號 乳劑

水稻，蔬菜
豆類，果樹

等用



優良準確
品質分效
成藥迅速

殺菌劑

(紋枯病用) **威力新** 登記證 802 號 液劑

(稻熱病用) **美稻農** 登記證 436 號 乳劑

殺蟲劑

殺可新	登記證 493 號
樂全	登記證 494 號
級巴	登記證 755 號
減力	登記證 281 號
蟲松	登記證 416 號
多松	登記證 415 號
靈丹	登記證 562 號
	登記證 501 號

大信農化工廠有限公司 台北市天水路十五號
TEL 44309 · 50945