

以完全的掃除和水洗消毒。

(4) 飼養會自然乾燥，不要天天花費勞力與很多時間去清除。
(5) 所生產之肉鷄大小齊一，品質優良可以高價出售。

缺點：

- (1) 無法小規模飼養。
(2) 容易發生由飼養而傳染的疾病（如球蟲病）。
(3) 飼養管理需要經驗。

鐵絲籠鷄室飼養和平面方式飼養的經濟比較可列如次頁附表，根據附表分析所得的資料，對於投資額的利益，平面方式飼養，較巴大利方式飼養，增加約達三成以上。

平面式宜於大範圍

小規模是巴大利好

(1) 沒有經驗的養鷄者和小規模養鷄，仍採用巴大利或鐵絲籠鷄室飼養為宜。

(2) 專門飼養肉鷄業的，以採用平面飼養的收益較高。

(3) 巴大利鷄室不容易完全消毒，因此育成率較平面方式飼養低。

(4) 巴大利和鐵絲籠方式飼養，飼料利用效率較平面方式低。

(5) 巴大利和鐵絲籠方式飼養，對於室內的通風和換氣應特別注意，尤其是最低層鷄室飼養，通常發育較中上兩層為差。

臺南地區注意稻飛蟲！

臺南區農業改良場，頑對臺南地區七十四鄉鎮

鐵絲籠方式養鷄需另設置飼養乾燥處理場

報，呼籲各地農友注意稻飛蟲發生情形，適時予以防治。

南改場說：由於本年氣溫較例年為高，所以稻

飛蟲發生也比往年為早，目前二備西螺、斗南、後壁、新化、官田、安南等地發生密度很高，現在飼糞排泄後立即與墊料混合乾燥，不會發生鳴氣。

(7) 無論採用何種方式的飼養設備，要育成優良肉鷄，



大王牌

(キング) 藥農

保證原封

◎浸透，擴散性增效劑——(說明書備索)

浸展 (キングシンテン)

包裝 100cc×60 500cc×20

特點：1.水稻稻熱病之防治用水銀乳劑或水銀片劑加用本劑 1,000~1,500 倍即能減輕藥害之發生，效力增強持久。
2.二、三化螟蟲之防治用 IBM (依必安乳劑) 巴拉松乳劑……等加用本劑即能使藥液浸透到水稻莖內發揮充分殺蟲效果。
3.與其他殺蟲殺菌等農藥均可混合使用。節省藥量；將農藥使用量減少二成而加用浸展即能收到同等以上效果。

試驗：將浸展作成500倍稀釋液在芋仔葉反面滴下一小滴，則呈現擴散與浸透現象。用市面一般展着劑做同等試驗則無擴散浸透現象。

◎稻熱病特效藥 水銀乳劑 (キング水銀乳劑)

登記證646號 包裝 100cc 300cc 500cc

IBM 乳劑 (キングアイビーエン乳劑)
登記證533號
滴濱微皮乳劑 (キング DV 乳劑)
登記證400號
除蟲菊精乳劑 (キング PGP 乳劑)
登記證401號
特靈松粉劑 (キングデイブテレツクス)
登記證528號
大滅速乳劑 (キングジメトエート)
登記證542號

可濕性硫磺粉劑 (キングサルトン75)
登記證408號
氨基水和劑 (キングモンゼット)
登記證657號
夏油 95 (キングマシン油95)
登記證211號
耐保根乳劑 (キングネマゴン乳劑)
登記證268號
耐保根粒劑 (キングネマゴン粒劑)
登記證269號

製造元：キング除蟲菊工業株式會社

臺灣總代理：英達貿易有限公司
臺北市華陰街39號 電話46980