

# 七種兔病治療法

• 季培元 •

最近本省養兔事業發展很快，因養兔方法簡易，如在飼養管理和疾病防治上善加注意，不難有良好的收穫。但家兔有很多種疾病，且有些常可引起嚴重的疾病，特別是幼年兔為多，所以須要適當治療，以減少損失。

養兔和經營普通的畜牧事業一樣，最大的原則是預防重於治療。平時在管理上注意環境衛生，籠舍設備等要勤加清潔，使兔保持健康，則可減少疾病的發生。

如糞便污物不要堆積在籠內，尿、飲水或雨水可使籠舍潮濕，要隨時保持乾燥，以避免病菌繁殖。籠舍器材要選擇容易清掃和保持乾燥的材料來製作。

夏天或濕季每星期至少清潔一次，冬天或乾季則可稍久些清潔一次。

籠舍和器具設備清潔後，如果是用來蘇液消毒的，則需等待藥液乾燥後再把兔子放進去。消毒藥液種類極多，和普通家畜或家禽房舍用的相同，可參照應用。

兔病的種類很多，以下是選擇幾種最普通而易發生的疾病和它的防治方法。

## 耳疥癬病

此病由小的疥蟲叫做蟻的寄生蟲所引起，有些進入耳的內部發病，使兔耳內發生潰爛，所以此病亦稱耳潰爛症。患兔有搖頭及試用前足抓耳等徵狀，耳內有滲出液，輕微的無大影響，但嚴重的如不加適當的治療，則損失亦很大，故須及早予以治療。

本病可用廿五份植物油，五至十份乙醚和一份碘仿混合，以此混合物擦在患部。或用九十五份植物油和五份四氯化碳混合後擦在患部。在六至十天內反復應用，可以治癒。輕微的患部，單用植物油塗擦亦有效。

## 腳關節瘡

這是家兔用籠式飼養常發生的病，發生在後腳關節的較多，前腳關節偶然亦有發生。原因是由於偶然的腳關節部受損傷後引起，開始是小的瘡傷，但如不治療，則瘡口增大，故須及早治療。

治療時先將患部附近的毛剪去，如瘡部已變成鱗狀的痂片，則用溫暖的肥皂水輕輕清洗，除去鬆動的痂片。然後用碘軟膏或氧化鋅軟膏塗敷，可使瘡傷癒合。如瘡傷已變為膿腫，則在治療前先把膿刺破，除去膿汁。再如法塗擦藥膏。有些情形如對藥物無效時則予淘汰，在不時管理上注意預防，如給軟的墊草等。

## 腹瀉

那是家兔疾病中最嚴重的一種病，特別是幼兔的死亡率很高。

引起腹瀉的原因極為複雜，患兔常食慾消失、無活力、無神、皮毛粗糙、眼混濁、耳下垂。有些病兔很渴，常匍伏在飲水器旁，頻頻飲水，有瀉痢，亦有皺脹情形。有些幼年兔在窩內時即感染，有些則並無顯明的影響，有些情形雖不治療，經數天後自愈，而有些則終生不再恢復正常的生長率。

本病可能由腸炎引起，但抗生素不能使腸炎完全治癒。有用 Nitrofurazone (NF-180) 來防治兔腸炎，很有效果，可加在飼料內給與，或用它的可溶性製品，加在飲水內給與，濃度為百分之〇·二。

## 球蟲病

家兔的球蟲病有腸型和肝型兩種，它的徵狀和腸炎相似，兩者在診斷上常發生混雜。球蟲病經糞便傳播，所以在飼養和管理上要注意。

治療可用 Sulfaguanoxaline 有效，可加在飼料內成百分之〇·〇二五的濃度，繼續給三、四個星期，或用可溶性 Sulfaguanoxaline 加在飲水內成百分之〇·〇二五的濃度繼續給二、三個星期。

另外有用百分之一的 Sulfamethazine 加在飼料內。輕症的濃度減低為百分之〇·五。在感染後十天給與有效，假如超過十五天則無效。

## 眼感染病

兔眼因細菌、塵埃、煙燻和其他刺激性東西等的侵襲而發生，患兔常閉眼。分泌很多分泌物。嚴重的因不能視物而影響採食情形。

治療先用百分之一至四濃度的硼酸水溶液洗眼，再用普通的或人用的眼藥膏來塗擦。

## 喉袋潮濕

喉袋就是頸上下垂的皮，在夏天因常飲水，使喉袋受濕，經久可使皮膚變為粗糙，甚至形成瘡痛，故亦須注意。

有效的處理方法是把飲水器墊高，減少喉袋受濕，必要時可把頸部下垂的皮上的毛剪去，使該部保持乾燥，另可用氧化鋅軟膏塗佈，直到情況改善為止。

## 肺炎

兔子的肺炎死亡率極高，兔因潮濕濕氣候急變塵埃，煙灰或其他刺激性東西都可引起。患兔和健康兔隔離，及早治療。

治療用青黴素和鏈黴素的混合製劑有效，通常用青黴素四十萬單位和〇·五克鏈黴素溶於兩西西水內，成年兔肌肉注射此種藥液兩西西，小兔一西西，在第三天重複注射。