



(余) 法離育易蘭的區地帶熱合通

養鷄需要多少設備？

翁銘統

養鷄的各種設備究竟需要多少？這是一個時常引起議論的題目。本文所報導的有關數字，有的摘自書籍文獻，有的是筆者的經驗。各位農友在準備開始養鷄或者是準備增加設備時，可以此作為參考。

根據以往的經驗來談，如果設備只能容納某一程度的鷄數目，即使勉強多養，也會因死亡而降到原來能够容納的數目。就是不死，也會減低效率而不經濟。例如，一個育雛器能容納一百隻，飼養一百二十隻時，小鷄就養不好，慢慢地自然會死亡到一百隻左右。這種情形，不管飼料槽也好，育雛箱的面積也好，都有這種情形發生。另外，由於小鷄的發育，品種的不同，或氣候條件的差異等，也都會影響這些標準的變化。因此，在實際應用時還是需要有一番斟酌的。

首先面積的問題，應將平飼和籠飼分別考慮。在平飼，每隻鷄的面積要求量的標準是：○至二星期為○·二平方尺；三到五星期為○·五平方尺；五到十星期為○·八到一平方尺；十一到二十二星期為二平方尺，成鷄重種（如白蘆花、紐漢西），三到三·五平方尺；輕種（如來航），二到二·五平方尺。

面積·隻數·標準·配合

籠飼時，每隻鷄的面積需要量如下：○到二星期○·二平方尺，三到四星期○·三平方尺；五到十星期○·六平方尺，十一到二十二星期一平方尺。箱式或巴大利育雛器，每羣勿超過一百隻，傘型育雛器每羣不要超過三百五十到五百隻。

應該使用的設備，在計劃之初應該準備好，不要臨時手忙脚亂。例如育雛器，中鷄籠的設備，應該在尚未開始飼養以前就先訂購好，並且設置完善。

飼槽·水槽·位置·大小

飼料槽的需要是算槽邊的長度，因此飼料槽兩邊都可以吃到的話，一尺長的飼料槽應有兩邊的長度。如果只能在一面吃到（如在巴大利或鷄籠時）就只能供應一面的長度而已。小鷄○到二星期每隻長度要○·八英寸，也就是每百隻八英尺。三到六星期每隻一·五英寸，或每百隻十五英尺。七到十二星期要二·五英寸長，每百隻二十五英尺。十二到二十二星期要三到四英寸長，每百隻要三十到四十英尺。使用目前市面出售的團型吊槽，每個可供飼肉鷄五十隻。種鷄、產蛋鷄則可供飼廿四到三十隻。但在特殊情形下，如用限制飼料量的飼養法時，只能供應到十二隻而已。設置飼料槽時要特別小心和水槽的配合。

通常飼料槽和水的距離應該在十英尺以內才不影響鷄隻的生產。

水槽的大小，在初生到兩週時應用兩個一加侖水壺。如果在鷄籠一直飼養時，則因為巴大利本身的構造關係，缺水的現象比較少，但中鷄籠的供水必需充裕。平飼時三到十二星期每百隻要三·三英尺。十二星期以上就要十二·八英尺。水槽和飼料槽間隔注意事項已經在前段提到。

地面·墊草·棲架·蛋箱

鷄舍地面以水泥地最是理想，因為水泥地便於

豐年有獎圖書測驗答案

(一) 甲	(二) 乙	(三) 丁	(四) 甲
(五) 乙	(六) 甲	(七) 丁	(八) 甲
(九) 丁	(十) 乙	(十一) 丙	(十二) 丙

附註：(1)對於測驗第七題答案如有疑問者，請看本報五十三頁「讀者來信」欄。
 (2)得分相同的於五十五年七月二十日上午十時在本社公開抽籤，決定得獎名次。

打掃，同時可以隔絕地面上傳來的濕氣。如果是籠飼，則地面使用水泥對收集糞有利，水泥地也不必再鋪墊。平飼要使用墊草。墊草的厚度以一·五寸以上為宜。鋪墊材料可使用甘蔗渣、木屑、花生殼或稻穀殼等。過去的方法是將墊草時常換新，現在美國方面則多使用長期墊草，稍為添加表面的鋪墊而不另行更新。更換糞時就將墊草堆積使它發酵，然後再用。

雞舍的設備，除此以外就是棲架和蛋箱。使用雞籠時，當然不必談雞舍或蛋箱，但是平飼時，這

就有必要了。小雞和肉雞可不用棲架。蛋用雞則需用棲架；每隻產蛋雞要五寸長。準備產蛋用的中雞就要用低一點的小棲架養成停留的習慣。等到大了以後就移行到大的棲架上。產蛋箱，通常沒有自閉設備的，每五隻用一個。有自閉門的產蛋箱是三隻用一個。翠鷄所用的產蛋箱也可以用每四十隻用二尺×四尺羣用蛋箱。

光線·燈泡·白天·晚間

光線不屬於設備，但和設備有關，因此在此稍為談一下：肉雞在十天齡以內，宜使用光亮的燈線使每隻小雞都能吃嗎。十天齡以後則宜少用強烈的光線。通常每二百平方尺的抹面積，使用一個十五燭光的燈泡即足，它的位置應離開地面六、七尺左右。點燈時間現流行的有兩種，一為每天連白天十二小時，另外一種整個晚間通通點燈，兩者都有良好的結果表現，產蛋雞除無窗雞舍，或用



將軍雞場中維巴(余)

漸減漸增點燈法有計劃性的點燈以外，應利用自然光線，切勿亂作點燈。盛產時期可不點燈，到了秋季，生產開始低落，最初應以十四小時，連白天的時間也計算在內開始，然後漸漸增加時間，以增強光線的刺激，但既點燈時要切忌減少點燈的時間。

真方便！
真有效！

售均行藥農·會農省全

請用安全可靠的水田除草劑

TOK Granular (農藥登記證第665號)

- ◎植物保護專家協會，農林廳推廣水田用除草劑。
- ◎每甲地用藥量30公斤，播秧後三至五天用手均勻撒佈即可，施藥後請保持田面水深三公分三天，以後缺水亦不影響其殺草效果。
- ◎可與肥料、粉劑或粒劑農藥混合使用。
- ◎施用多谷粒劑後，完全不必再行人工除草。
- ◎對水稻不會發生藥害，對人畜、魚介類無害，可安全使用。

臺灣區經銷：臺中縣霧峰鄉草湖路二號(電話63號)

正豐化學股份有限公司

臺灣總代理：臺北市漢口街一段一四四號七十一室(電話三六一七七)
青象貿易有限公司

標商記登司公斯哈門羅國美*

圖說明書函索即寄