稈加用化學肥料等供堆積發酵腐熟，適於洋菇生長，但是洋菇生長並非直接利用草稈與硫安或尿素，而是藉助微生物繁殖分解後之產物，但在微生物繁殖上必需硫安、尿素等養分。（胡開仁）

蘆筍嫩莖末端散開
品種不純營養不良

【問】：我與隣居共種約一甲蘆筍，今年剛培土並開始採收，但成績很差，收量多，但「成交」少，每枝都是露出土面或在土中即分叉，請問是何原因？是品種或管理不當？（馮春龍）

【答】：(一)此種蘆筍可能是本省自行採種所育成的苗，因本省無經過父母本選拔就採種，故所育成的植株其嫩莖會早期形成側枝，且筍尖容易散開。

(二)苞葉散開係早期側枝發生所致，其與品種來源有關，土壤水分及植株營養也有關，如不屬於品種來源，請加強定期灌溉，配合肥料分施及有機質肥料之施用，就能減少此種現象的發生。（王進生）

玉米

抗露菌病玉米種子
向種苗繁殖場洽購

【答】：我準備栽種一甲地的雜交玉米，據聞最近有抵抗露菌病的玉米種，未知那裏可以買到？（嘉南縣新營鎮嘉芳里八號吳山知）

【答】：抗露菌病雙雜交玉米命名爲「臺南八號」，目前正辦理登記名命中，同時在臺中縣新社鄉種苗繁殖場繁殖中，該場郵政劃撥號碼爲中字第二一八〇四號，請直接向該場洽購。（張新吉）

木花

盆栽榕樹宜小葉種
劍竹用分株法繁殖

【問】：(一)盆栽用榕樹多以種子播種，但我常用種子播種，總是不成功，原因何在？

(二)榕樹品種以那類最好？

(三)劍竹的繁殖方法如何？

(四)臺灣現在完全花卉肥料，以那牌子最好？（嘉義縣民雄鄉中樂路七四號蔡明豐）

【答】：(一)榕樹種子的發芽需時甚長，普通約需二至三月（氣溫高時需時較短，反之較長），因此平常的管理甚爲重要，如果疏於管理種子往往中途腐敗或枯死。

(二)盆栽用的榕樹，普通多用細葉正榕（或稱小葉種）。

(三)劍竹的繁殖法和普通竹類一樣，用分株法繁殖。

(四)花卉肥料以臺灣肥料公司出品的「農友牌」最好。（謹靜吾）

濕地松・琉球松種子特徵

【問】：(一)請問正南美松的種子何處可買到。

(二)琉球松與南美松種子外觀上有何差別？（新竹縣峨眉鄉縣坪村一鄰一九號莊建廷）

【答】：(一)南美松一般稱濕地松，較大種苗商店均有出售。

(二)琉球松種子長卵形，黃褐色，較米粒爲小，長爲寬的一倍，平均長約〇・四—〇・五公分，具小刀狀之翅，其長約爲種子之三—四倍，故種子連翅長約二公分，翅基部稍肥厚，圍繞種子之上部具紫黑色細條。

南美松（濕地松）種子卵形，黃褐色，較米粒大一倍餘，長不及寬的一倍，平均長約〇・七公分，種子連翅共長二・五公分，翅小刀狀，基部略肥厚，圍繞種子之上部具有紫黑色細條。（黃希周）

畜家

安可拉毛兎
有飼養價值

【問】：(一)安可拉毛兎在本省確有飼養價值否？

(二)據說有英、法、日各國之系統，其特性何在，那種比較適于本省飼養？

(三)選購及飼養法如何？（雲林斗南鎮北

獸畜及家禽用特效驅蟲藥

「芬樂維斯」 農畜衛可字0601號

'PHENOVIS' (PHENOTHIAZINE)



侵害家畜之寄生蟲主要者有三，即條蟲、肝蛭及蛔蟲。其中以蛔蟲最爲危險。其細小者，身長僅半寸至一寸，薄若棉線，然在動物體內繁殖，有時竟達十萬條之多，其爲害之大，可想而知。

各種家畜體內，皆有蛔蟲寄生，此種寄生蟲往往使禽獸發生貧血病，精力衰退，全身虛弱，若不救治，可能因而致死。

「芬樂維斯」若施用得當，實爲最安全可靠之驅蟲藥劑，不論治療或預防，均屬有効。

總代理：英商卜內門化學工業有限公司
臺北市中正路1800號
總銷處：國際家畜藥物廠
臺北市長安東路一段三九號

※新到貨※

蘆筍種子
初秋甘藍
濱綠包心白菜

美國 BURPEE DESSERT 公司原封罐裝
美國麗華盛頓五〇〇〇九號蘆筍子
◎美國加州五〇〇號蘆筍子
日本タキイ種苗株式會社
◎長岡交配初秋甘藍
日本サカタ種苗株式會社
◎坂田交配濱綠包心白菜

臺灣總銷處 榮華種子行
三重市重新路二段三之一號
電話：九七二一七四九號
郵政劃撥儲金一三五七一號
捷發行
和美鎮中山街64號電話29號

本刊廣告價目

封底全頁（二色）	四千九百元
封面裏全頁	四千四百元
封底裏全頁	四千元
正文第一頁全頁	三千八百元
正文內頁全頁	三千五百元
正文內頁半頁	一千九百元
正文內頁三分之一頁	一千四百元
正文內頁四分之一頁	一千零五十元
正文內頁六分之一頁	七百五十元
正文內頁八分之一頁	六百元
養鷄專欄廣告一單位	三百二十元
小廣告 每行十元，超過二十行部份每行二十元	