

農業信箱



作稻

稻種臺中一八六號是早熟種

一、二期糊仔甘藷產量不同

【問】：(一)水稻新早熟品種臺中一八六號，一、二期產量多少？適合那一期作？
 (二)臺中一八六號和臺中一七八號栽培上那種容易？產量比較如何？
 (三)一期糊仔甘藷新竹一號和沖繩一〇〇號那種產量較高？各多少？
 (四)二期糊仔甘藷新竹一號和沖繩一〇〇號那種產量為高？產量各多少？(彰化花壇鄉南雅村奇園巷八號王明財)

【答】：(一)水稻臺中一八六號品種，第一期作產量約每公頃四千公斤，第二期作三千二百公斤左右。
 本項產量將依地方，栽培方法，施肥量等而不同。
 本品種為早熟種，第一期約一〇五天，第二期約八十五天(自插秧至收成)，故適合于需要早熟水稻品種之輪作地區栽培。
 (二)臺中一七八號與臺中一八六號比較，以前者較後者遲一週左右，產量當以較晚熟之臺中一七八號為佳。
 (三)一期糊仔甘藷之塊根產量以沖繩一〇〇號比新竹一號為高，至於產量多少，因受栽培方法，栽培時期之早晚及氣象要素而不能一概而論，據臺中改良場試驗結果，沖繩一〇〇之塊根產量每公頃約一萬至一萬二千公斤。新竹一號約為八千至一萬公斤。
 (四)二期糊仔甘藷之塊根產量，新竹一號比沖繩一〇〇號為高。以改良糊仔栽培塊根

收量，沖繩一〇〇號為每公頃八千一萬二千公斤，新竹一號為一萬五千二百公斤。
 沖繩一〇〇號適宜于高溫多濕之第一期糊仔栽培，新竹一號即適宜于低溫乾燥之二期糊仔栽培，但如果依照普通糊仔栽培法，上述產量將無法達到，約可收到前述產量之半而已。

【問】：(一)南投地區第二期除了現有優良品種，如有，何處可交換該品種？又其特性如何？
 (二)現在臺中一八〇號稻種何處有原種交換？
 (三)貴社有否草菇種植手冊？(南投鎮當南里南營路二〇五號)

【答】：(一)在第二期作除了臺中一八〇號稻種外，尚有由臺中一八六號早熟稻種，現在臺中一八〇號已不再推廣，而改為臺中一八六號。
 明年第一期作，當可由各縣農會之原種田獲得種子。
 至於臺中一八六號比臺中一八〇號遲二、四、天，但亦是早熟品種之一，而其產量較高約一成左右，且較抗稻熱病，草丈也較高，但分蘗稍少。米質則兩品種均佳。
 (二)如第一項所敘述的，臺中一八〇號稻種現已決定取消推廣，故現在無法得到原種子。
 (三)本社現無草菇種植手冊，草菇種植法淺說，臺中農業改良場已有油印的資料，若需要該項資料，請直接向縣農會索取即可。(林克明)

【問】：(一)水稻新早熟品種臺中一八六號，一、二期產量多少？適合那一期作？
 (二)臺中一八六號和臺中一七八號栽培上那種容易？產量比較如何？
 (三)一期糊仔甘藷新竹一號和沖繩一〇〇號那種產量較高？各多少？
 (四)二期糊仔甘藷新竹一號和沖繩一〇〇號那種產量為高？產量各多少？(彰化花壇鄉南雅村奇園巷八號王明財)



大王牌

(キング) 農藥

保證原封

◎浸透，擴散性增效劑——(說明書備索)

浸展 (キングシンテン)

包裝 100cc×60 500cc×20

- 特點：1. 水稻稻熱病之防治用水銀乳劑或水銀片劑加用本劑 1,000~1,500 倍即能減輕藥害之發生，效力增強持久。
 2. 二、三化螟蟲之防治用 IBN (依必安乳劑) 巴拉松乳劑……等加用本劑即能使藥液浸透到水稻莖內發揮充分殺蟲效果。
 3. 與其他殺蟲殺菌等農藥均可混合使用。節省藥量；將農藥使用量減少二成而加用浸展即能收到同等以上效果。
 試驗：將浸展作成500倍稀釋液在芋仔葉反面滴下一小滴，則呈現擴散與浸透現象。用市面一般展着劑做同等試驗則無擴散浸透現象。

◎稻熱病特效藥 水銀乳劑 (キング水銀乳劑)

- IBN 乳劑 登記證533號
- 滴滴微皮乳劑 登記證400號
- 除蟲菊精乳劑 登記證460號
- 特寶松粉劑 登記證528號
- 大滅速乳劑 登記證542號

- (キングアイビーエン乳劑)
- (キング DV 乳劑)
- (キング PGP 乳劑)
- (キングテイブテレックス)
- (キングジメトエート)

- 登記證646號 包裝 100cc 300cc 500cc
- 可濕性硫磺粉劑 (キングサルトン75) 登記證408號
 - 蒙 穗 水 和 劑 (キングモンゼット) 登記證657號
 - 夏 油 95 (キングマシン油95) 登記證211號
 - 耐保根乳劑 (キングネマゴン乳劑) 登記證268號
 - 耐保根粒劑 (キングネマゴン粒劑) 登記證269號

製造元：キング除蟲菊工業株式會社

臺灣總代理：英達貿易有限公司
 臺北市華陰街39號 電話46980