

樹果

梨樹修剪適宜 促進開花結果

【問】：(一)貴刊十六卷八期農業信箱上有：「促進梨樹開花結果，可利用枝條環狀剝皮」，這「剝皮」至何種程度？是否需要剝到骨幹？

【答】：(一)種植十數年的梅樹儘管開花，但從未結過一顆果子，其原因何在？開花時是否忌澆？需要施用何種肥料？於何時施用？(新竹縣新埔鎮寶石里七七號林傑鋼)

【答】：(一)促進梨樹開花結果可利用修剪法，即夏季當枝條生長在一尺許時施行摘心，到冬季落葉後再行短剪，促進其側芽形成短果枝而結果。如用環狀剝皮其剝皮之時期與寬度均應適合，否則會有相反的結果，期與寬度均應適合，否則會有相反的結果，會使樹勢變弱，產量降低。至於所問剝皮之程度，是僅剝去其皮層深達木質部，即由根部吸收之養分仍可上昇，而製造之養分不能下降。如全部之枝條作環狀剝皮，則根之生長受阻，必影響其生長勢，故剝皮寬度甚為重要，過窄則作用不大，過寬則癒合時間長，樹之生長勢變弱。在樹之生長旺盛時可稍寬些，在生長弱時必須窄些。一般梨樹其生長旺盛，不開花結果，可在主幹下部施行環狀剝皮，其效果較大。

(二)已種植十數年之梅樹只開花不結果，土壤過肥或過濕，或可能在開花期降雨影響授粉。雖有影響但不致一顆果實不結。但不知所植為何品種，如係日本品種有許多自花結實很低的，即必須混種其他品種。施肥料宜視土質而異，一般應注重有機肥料，可於落葉後至萌芽前施用。(朱長志)

柿樹繁殖宜採用嫁接法

秋後乾燥促進荔枝結果

【問】：(一)紅柿繁殖以何法最宜？可否用高壓？應在何月施行？

【答】：(一)荔枝樹中有幾類二十餘年生鳥葉種荔枝，枝葉尚茂，但迄今未見開花或發新芽，請問是何原因？或有何種賀爾蒙促使其開花？(南投竹山鎮山崇里溫水巷三六號張坤焯)

【答】：(一)柿樹不用壓條繁殖，在臺灣可用野生柿作砧木，舉行嫁接(切接)，取食用柿種子育苗作砧木也可以，嫁接時期以十二月二日最適宜。

(二)荔枝秋前生長的新梢，入冬經過休眠才可能形成花芽，秋後生長的新梢至翌年春季還不够成熟，是不能開花的。要荔枝開花結果多，必需設法抑制秋後抽梢。最好的方法是在秋後使其充分乾燥，並停止施肥。待開花時，進行適當澆灌。(張振宙)

菜蔬

一期稻以後可種甘藍 蔬菜禁止施用「安特靈」

【問】：(一)現在播種甘藍準備一期稻收穫後移植，採用「初秋」或「新夏秋」，那一種好？

(二)去年種「初秋」有腐爛情形，據說「新夏秋」較不腐爛可保嗎？

(三)生長管理，品質產量，收期比較如何？

(四)去年農曆八月廿藍結球期蟲害發生很多，蟲體大者如鉛筆幹，黑花中帶有綠點，噴馬拉松効力差，請問可噴何藥？

(五)未結球前可噴安特靈嗎？

(六)夏季番茄最早可在農曆幾月播種？以何種為宜？過旱時可灌澆嗎？立枯、青枯病有何防治法？(臺北縣萬里鄉行聖村八新四三號蔡蒼明)

【答】：(一)第一期水稻收穫後種植「初秋」或「晚普」較宜。
(二)「初秋」在盛夏易發生黑腐病，但為害不嚴重。
(三)注意灌水，肥料宜分施，在夏季栽培無論那一品種均為重要。「新夏秋」品種尚未試作過，可能本省種子商自行改名出售者。
(四)可能是夜盜蟲或番茄夜蛾之類為害，應在包葉前徹底防治，可噴射三五%安特靈或六四·五%大必隆等一千倍液。
(五)蔬菜不可噴安特靈，因安特靈之殘毒時間持續二箇月以上，故絕對禁止使用。

濱綠卷心白菜 (煙臺包心白菜)

生產：日本坂田種苗株式會社
外銷最佳品種



一代交配種，品質最優，最適合內外銷，市場價值最高，最受歡迎之品種，極早生種，播種後六十日即可達每球一·五~二·五公斤，耐熱性極強，而栽培容易，比他種白菜收量豐富。

地區	播種期	適期
北部	三月上旬	五月上旬
	三月中旬	五月中旬
中部	二月上旬	四月上旬
	二月中旬	四月中旬
南部	正月上旬	四月上旬
	正月下旬	四月下旬


(說明書備索·全省各大種子行有售)

長岡配初秋甘藍

生產：日本夕キイ種苗株式會社

全天候高麗菜，週年可以栽培

唯一外銷高麗菜



耐暑性特強，食味最好，市場價值最高最受歡迎之早種種！發育特快，週年可以栽培之萬能甘藍，外銷最受歡迎，價格最高之甘藍。

總代理

茂生有限公司

臺北市南昌路二段六六之二號
電話二一八五〇·三〇九四一

總經銷：榮華種子行 臺北縣三重市重新路2段3之1號
捷發行 和美鎮中山街64號