

，應在製造上多研究「調味竹筍」，使家庭主婦，開罐加熱即可食用，至少在裝罐以前，加以切片切丁或切絲，以求減少主婦切菜時間，因其省事便利，主婦便樂於多多利用。第二，竹筍為一低「卡路里」食物。可能為減輕體重食譜的良好成份。美國婦女最關心過胖，應利用竹筍的這種特性，廣事宣傳。我國駐美投資服務處胡光泰先生認為這是在推銷上最可以利用的特點，應該好好的推動。同時，這種罐頭上最好印刷幾個中國色彩或意味的文字，如「中國竹筍」等字樣，以助長罐內食物的實際風味，也是推銷上最值得利用的一個法寶。

麻竹筍如要細嫩，在栽培方面也有幾種方法，

可以幫忙：第一、提早採割，當麻竹竹筍的葉葉二片反張時，即行採割。目前普通是在四片反張時採竹筍罐頭裝量最低標準

(單位：公克)

割。第二、麻竹栽培應實行集約經營，施行蓋草、培土除草、施肥、冬季中耕等作業。第三、早地作園，予以適時的灌溉。

種類	新 一 號 罐					二 號 罐					三 號 罐					四 號 罐					平 二 號 罐				
	內容量	筒量	內容量	筒量	內容量	筒量	內容量	筒量	內容量	筒量	內容量	筒量	內容量	筒量	內容量	筒量	內容量	筒量	內容量	筒量	內容量	筒量			
竹 筍	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
調 味 竹 筍	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
酸 筍 衣	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			

注意：農藥的安全使用！

劉 舜

本省中毒率並不高

本省自民國四十二年引進新式農藥，到目前，農友們對使用農藥防治病蟲害已有深刻的認識，所以無論在應用農藥的數量或是在增產效果方面，都日見增高。

使用農藥固然可以防治病蟲害增加生產，但有些農藥具有劇毒，使用時稍不小心，就會發生生命的危險。由於本省農村知識水準普遍提高，各有關單位加強宣傳，並採安全措施，本省農藥中毒率並不太高。

糧局加強安全措施

糧食局為保障農友使用農藥時的生命安全，自民國四十九年起，每年均大量向國外採購有機磷劑類農藥解毒藥品「巴姆解毒劑」乙種，免費贈送中毒農友使用，自辦理以來，對於中毒農民的治療，功效顯著。糧食局為加強本項業務，除繼續採購該項藥品免費供應外，並自五十五年四月起，將該項藥品除原來分配鄉鎮(市區)農會及衛生所(包括山地鄉)保管外，再增鄉鎮市區公所一處保管，並在交通不便的村里，由鄉鎮(市區)農會撥糧食局當地管理處，分發給核准指定持有執照的私立醫院保管備用。又該藥品均經分配各單位，並指定專人負責保管，中毒農友無論日夜或例假日均可隨時逕向當地農會公所或衛生所或指定的私立醫院申請應用，手續極為方便。

二期作要特別小心

今年第二期作水稻已經開始栽培，根據過去的經驗，每年二期水稻栽培期間，農藥中毒的發生，都比較第一期作為多，分析其原因，不外乎下述三點：

- 一、第二期水稻栽培期間，病蟲害的發生較第一期作更為複雜而嚴重，農友們為避免自己種植的水稻遭受病蟲害損害，勢必施用較多農藥，中毒情事也隨之增多。
- 二、第二期作期間天氣炎熱，穿著防毒衣具較難忍受，農友們常穿著極少的衣服，赤裸著手足，在夏天陽光照射下噴藥，這時身體容易疲倦，抵抗力也比較弱，稍不小心，就容易發生中毒。根據我們過去的調查紀錄，每年在八、九月間，因為使用農藥而中毒的農友為數很多。
- 三、本省夏季蔬菜供應缺乏，農友們為爭取時間，在栽培期間，往往不按照政府規定而噴射劇毒農藥。食用這種帶有殘毒的蔬菜，有時也會引起毒。

「巴姆」免費供應治療

不按照規定使用農藥，不但使用的人容易中毒，就是間接地連消費者也會受到危害。為了本身的安全，同時也為全國軍民的健康，農友們使用農藥防治病蟲害時，請隨時隨地提高警覺，並應該注意選購成份可靠的農藥，依照政府推廣的規定加水稀釋，千萬不要自作主張隨便提高濃度。如果農友使用有機磷劑類農藥不慎中毒，請立刻向當地農會、公所、衛生所或經農會指定的私立醫院，領取「巴姆解毒劑」醫治，來挽救寶貴的生命。