

大生四十五 防治

香蕉葉斑病

香蕉葉斑病為害直接減少健康的有效葉面積，而致使產量銳減間接影響香蕉的品質。健康的香蕉在成熟時每株應有十二張葉片，受葉斑病侵害的香蕉因葉片減少以致果房不能成熟，或果指呈角狀細小且成熟度極不平均。雖其香味仍可保持，但因過於細小而減低或喪失其商業價值，直接影響農利。香蕉受葉斑病為害不嚴重者，果實仍可充分膨大，外觀與未受害者甚難區別，但果肉已轉為乳黃色，如未剔除，將在輸送途中黃熟，引起腐爛。

發生葉斑病的原因有一種真菌生長在香蕉葉片上，它可以吸收葉片的養分，破壞葉片的組織，所以很快地使香蕉葉片枯死。破壞葉片來一張香蕉葉片自長出來以後可以活五個月左右，但如香蕉葉片發生嚴重的葉斑病時，葉片只能活一個月或兩個月就枯死。香蕉葉片是供給香蕉養分最主要的部份，如果沒有葉片香蕉就根本不能成熟，如葉片枯死的太多，當然會影響產量及品質。

一般說來，每年九月（有的蕉園七月開始）到次年一月（有的蕉園三月還發生）葉斑病發生最普遍而嚴重。因為引起葉斑病的病原菌，在雨季空氣中濕度大而溫度適宜時（大約攝氏廿五度左右）生長最速，侵入香蕉葉片最容

臺灣省政府農林廳頒行之五十五年度植物保護推廣方法第九一頁列舉香蕉葉斑病防治方法如下：

時間	使用藥劑種類及每公頃用量	防治術	備註
全年		經常清園，刈除發病枯葉，埋入土中或搬離蕉園燒燬。	一、藥劑調配： ①香蕉用礦物油與 ②香焦心葉及其葉片 攪拌均勻。一四 ③大生以水調成糊 狀。與②混合後加 二、水。本方法最好以 共同防治方式操 作。
四月每月二次	香蕉用礦物油三公升，加「出來」	以動力微粒噴霧機噴	
六月七月每月一次	通「一四」八〇公攝，加「大	生五〇公升。	
八月十月每月二次	生四十五。二二五公升，加水	二五〇公升。	
十一月十二月（旱季）每月一次	香蕉用礦物油十九公升，加「出	來通「一四」八〇公攝，加水	二二〇公升。

易，感染也最快。所以在這一段時間葉斑病最高，有時下小雨或大霧，可以使空氣中濕度甚大，此時葉斑病最容易發生。有的地方很久沒下雨也會發生嚴重的葉斑病，但這些葉斑病並不是在干旱時才發生的而是很久以前的雨季或高濕的環境下，病原菌已經侵入而感染，經一段時間病徵就開始出現。因下雨時葉片受水份的滋潤不容易乾枯，但如果發生葉斑病後不久一直都是乾旱的氣候時，因病葉組織已被破壞，水份較少，故發生葉斑病的葉片很快的就枯死。這就是在干旱時也會發生嚴重的葉斑病原


香蕉葉斑病的病徵有三種：(一)圓斑型：此種病斑多生於一公尺左右之幼小蕉苗或高大蕉株之下部葉片上，被害葉片呈圓型或類似圓型。後期病斑呈灰白色而有黑褐色或灰褐色之邊緣，背面則呈深褐色。(二)細線型：此種病斑多發生於葉片窄長之幼小蕉苗及成長蕉株之中上部葉片上，病斑多與脈平行生長，呈褐色，老葉表面則呈灰白色或灰褐色稍下陷且有褐色之邊緣，一病斑背面呈灰褐色，邊緣呈灰褐色。(三)橢圓型：此病徵於葉片表面呈褐色不清晰病斑，隨日進展成枯斑表面灰褐色背面黑色或灰褐色，末期自葉片邊緣向中肋枯死，最後蔓延到葉柄，使葉柄軟化腐敗而垂折於莖莖上。

使用大生四十五防治香蕉葉斑病可增加產量若干，在最高濕地區如使用得當，可增加產量九成以上。

大生四十五係現代最進步最有效之農作物用殺菌劑，其生化性質與大生二十二及大生七十八或兩者之混和物都不相同，其防治各種病害效果奇佳如按規定使用絕無藥害，大生四十五已由植物保護審議會列入推廣於防治下列病害：

- 番 茄
- 馬鈴薯
- 大豆
- 落花生
- 香 蕉
- 晚疫病
- 銹 病
- 葉斑病

* 大生四十五 (DITHANE M-45) 二磅紙袋原裝



號貳貳柒第證記登藥農

現貨供應
興農化工股份有限公司
臺中縣大肚鄉中和村中山路10-6號
電話：烏日局一〇六號
臺灣總代理
青象貿易有限公司
臺北市漢口街一段一四四號七一一室
電話：三六一七七號

◎說明書函索即寄

* 美國羅門哈斯公司登記商標