

鈣五百公克，硫酸鎌二百五十公克，氯化鉀六十公克，充分混合，然後移置於塑膠布所圍成的床框中，用木板或金屬鐵平整床面，洒水後蓋以草蓆等，陰乾，以防龜裂，至翌日半乾時，割成十公分左右的方塊，即可播種。設置床框時，下面頭敷一層約三公分厚的谷殼。

每一土壤中，播四至五粒種子，到本葉二葉時，間拔為每一方塊留二株。育苗時間約半個月，苗齡三至四葉時移植本圃。

育苗期間須注意病蟲害防治，尤以蚜蟲、小菜蛾、菜心蝶等為害較大，應每隔四至五天噴射DDVP一千倍液一次為佳。

本圃所需基肥，和直播栽培時相同。在水田，每畦種四行。畦上掘好植穴後，將土鉢種下，栽植完了後，在根際撒佈短切稻草以免驟雨來襲使根際土壤固結，並防止畦面泥土濺附葉面，阻碍生育。

早期結球白菜應充分施用堆肥或鴨糞等有機質肥料，以改善土質，使土壤中通氣良好，助長枝株生育。

精或五〇%馬拉松乳劑六百倍液均可。在早上有翅蚜蟲活動時間內噴藥效果較佳。

生育。

## 多施堆肥注重基肥

早期栽培所採用的品種都是早生種，所以應注重基肥，並應在播種後三十天前充分追肥。本葉二至三葉時施用第一次追肥，以後每隔七至八天追肥一次，追肥的肥料，以尿素和氯化鉀為佳。

	第一次	第二次	第三次
尿 素	一〇	一四	一六
氯化鉀	八	一〇	一二

追肥應離開根際施用。又追肥時，須加強灌溉，以免土壤溶液濃度增加而傷根。本省慣行的施肥方法常備重氮素，應予矯正。

漳浦三十五天和濱綠品種，對於毒素病抵抗力較差，應從本葉展開後，注意防治蚜蟲。噴射魚藤

## 防治病蟲保證豐收

旱地的沙質壤土，容易發生黃條葉蟻，在生育初期，宜噴射殺蟲淨乳劑一千四百倍液。結球期宜噴射賽文五百倍液。菜心蝶宜噴射一五%DDT乳劑五百倍液。小菜蛾白粉蝶等宜噴射六〇%大利農一千倍液或五〇%DDVP一千倍液。

早期栽培容易發生軟腐病，尤以結球期發生為烈。為預防該病發生，須噴射賽文六百倍液防治黃條葉蟻，減少喰傷，避免細菌由傷口侵入。於結球期，約每隔七天，向葉柄基部噴射大生七八可濕性粉劑四百倍稀釋液一次。為防止黑斑病發生，宜將種子浸漬冷水六小時，再浸漬於攝氏五十四度溫水中五分鐘。注意施肥，增施鉀肥，使植株生長健全，為防治病害的上策。

精或五〇%馬拉松乳劑六百倍液均可。在早上有翅蚜蟲活動時間內噴藥效果較佳。

生育。


## ★進口原裝

強力殺蟲劑·螟蟲特効藥  
必愛用乳劑(PIN)·益農產乳劑

(登記證第一九二)

(登記證第八二一七)

一滴一見一效



日產松乳劑·日產馬拉松乳劑  
日產巴拉松乳劑·日產蟲必死乳劑

(登記證第七七八四)

(登記證第七七八二二)

(登記證第七七八八)

日星實業股份有限公司  
台灣日產化工股份有限公司  
台北市南京西路5號之1 電話59961~4