

王思涵

題目:公牛母牛傻傻分不清楚

內文:

牛隻的性別如何區分呢?看頭上有沒有角?看有沒有乳房?

其實，牛隻的性別判定與所有的動物的判定方法一樣，由生殖器的特徵不同作判斷，公牛有外露的陰囊；母牛尾根下方有外陰部。一般常見乳牛場中看到的都是母牛，只有在以飼養肉牛為主的牧場才會看到多數的公牛。小姐牛(女牛)在經歷配種、懷孕 280 天左右後分娩小牛便開始泌乳，泌乳牛的外觀主要可由膨脹的乳房做區別，泌乳牛以四個膨脹的乳區來貯存並分泌乳汁，不一定比較大的乳房會分泌比較多的乳汁，每頭牛的全期泌乳量與泌乳期長短都不相同。牧場中的乳牛不論性別公或母都會在出生十天左右進行去角，這是要避免牛隻的打鬥行為，所以並不能用乳牛有角或是沒有角作為性別的判斷。偶而，也是會看到有角的母牛這是因為在化學去角的過程中，藥劑沒有完全發揮效用所造成的結果。下次，到牧場看到乳牛時可以仔細的觀察一下牛隻的各項特徵，你會發現有很多有趣的地方喔!



圖一、由上圖可看到小公牛腹部有外露的陰囊(左)，小母牛則是於尾根下方有外陰部



圖二、正值泌乳期的媽媽牛



圖三、六個月齡左右中女牛