

8. 蓴

蓴科 Cabombaceae

學名：*Brasenia schreberi* J. F. Gmel.

別名：蓴菜、莼菜

- ✿ 習性：多年生浮葉性草本，生長於低海拔湖沼濕地。
- ✿ 莖葉：有地下匍匐莖，浮水葉橢圓形，長 5~10 cm，寬 3.5~6 cm，葉背綠色，有長柄，嫩葉及基枝具透明黏液。
- ✿ 花果：單生花序，花瓣線形，3 枚，膜質，紫紅色，長 1.3 cm，寬 3.2 mm，雄蕊 22 枚，雌蕊心皮 9 枚。漿果卵形，長約 0.8 cm，基部狹窄，頂端具宿存花萼，具喙，種子長橢圓形，土黃色，長約 1.2 mm。
- ✿ 分布：日本、中國、越南及台灣，台灣僅見於東北部湖泊及沼澤。
- ✿ 用途：可作為食用及水池綠美化之用。
- ✿ 撫育管理：以地下根莖繁殖。適生水位介於 50~200 cm，有明顯季節消長現象，春夏為主要繁殖季節，但不適合平地生長。本種適合乾淨之水質。



族群生長情形



蓴之橢圓形葉



黏液及走莖情形



果實