


119. 臭腥草

三白草科 Saururaceae

學名：*Houttuynia cordata* Thunb.

別名：蕺菜、蕺菜、魚腥草、九節蓮

- ✿ 習性：多年生草本。多生長全島低海拔之水域邊坡或林道旁。
- ✿ 莖葉：根莖圓筒狀，白色；莖直立，紅紫色。葉互生，有柄，卵狀心形，全緣，長 4~8 cm，背面常帶紫色。
- ✿ 花果：花穗長 1~3 cm，淡黃綠色；總苞白色，大型，長 1.5~2 cm，大小不一，花瓣狀；花被缺如；雄蕊 3 枚；花柱 3 枚。蒴果球形，3 裂而彈出淡褐色微細之種子。
- ✿ 分布：中國、南亞、日本及台灣。台灣產於平地及丘陵地。
- ✿ 用途：全草藥用，有散熱消腫及利尿之效；可應用為農場道路、石礦區、棄土區及河岸工程周邊之植栽材料，常自然形成小群落生長。
- ✿ 撫育管理：對氣候冷暖適應性廣，忌乾旱，以含腐植質的砂質壤土最理想。帶鬚根之母莖切成 10~15 cm 扦插繁殖，株距 10~15 cm，管理方式須除雜草及施用有機肥。



臭腥草之植株生長情形



花