

124. 水麻

蕁麻科 Urticaceae

學名：*Debregeasia orientalis* C. J. Chen

別名：柳莓

- ✿ 習性：常綠灌木或小喬木。
- ✿ 莖葉：株高可達 6 m，分枝多，嫩枝有毛。葉互生，有柄，長約 1~3 cm，淡紫紅色，線狀披針形，葉背具白色長柔毛，3 主脈，長 8~15 cm，寬 1~2.5 cm，具細鋸齒，表面粗皺；托葉披針形。
- ✿ 花果：雌雄異株，頭狀花序呈聚繖狀排列，腋生；雄花有毛，花被與雄蕊各為 4 枚，互生；雌花之花托肉質，黃色。果實熟時橙黃色，瘦果卵圓形，長約 0.6 mm。
- ✿ 分布：中國、日本及台灣。台灣常見於山麓至海拔 2,500 m 之林緣及陰濕溪谷。
- ✿ 用途：固土護岸。另葉可為水鹿之飼料；樹皮用為纖維；果味甘，可生食。根及幹供藥用，治腳風。
- ✿ 撫育管理：以播種或扦插法繁殖。性喜潮濕，土壤以富含有機質之肥沃壤土為佳。小苗袋苗栽植，株距 0.5 m。



花序及葉片形態



水麻之植株生長情形



果實



花序形態