





圖2. 賴文龍於果園講解綠肥大豆栽培



圖3. 農民觀摩果園綠肥大豆生長



圖4. 綠肥大豆覆蓋情形



圖5. 綠肥大豆開花結莢及根瘤

之百，利用其分枝多莖葉旺盛之優點覆蓋果園，可以有效抑制果園雜草橫生。十月播種之苕子每公頃播種量50公斤，生育初期呈放射狀分枝，生長迅速可在短期間內全面覆蓋果園地被，這兩種綠肥作物生育期均長達六個月以上，覆蓋期長且抑制雜草效果佳。此種輪植栽培方式最大特色是利用兩種季節

不同生育期之綠肥交互栽培周年覆蓋果園，可以增加果園土壤肥力，維護果園生產力，是果園草生栽培極佳之綠肥作物。此外，陳課長亦強調，為穩定果園生產並達到農地永續經營利用的目的，果園草生栽培種植豆科綠肥作物，應以生草量高且具匍匐性之綠肥品種為宜。

推廣於柑桔、梨、葡萄及

其他果園種植綠肥作物栽培覆蓋地被抑制雜草滋生，每年每公頃可節省果園鋤草或噴施除草劑六至八萬元以上費用，可以說是保護土壤、節省勞力、降低生產成本的好策略。因此，特藉由此項技術的推廣，普及果園栽培利用以穩定果園生產，而達到農地永續經營利用的目的。

