



# 馬拉巴栗介紹

文圖／陳彥樺、蔡宛育

## 前言

馬拉巴栗(Malabar chestnut)屬木棉科(Bombacaceae)的熱帶小喬木，原生於中美墨西哥一帶，民國20年自夏威夷以果樹類引

進臺灣栽培。馬拉巴栗對臺灣風土習性適應力強，生育結實狀況良好，且耐陰性強，生命力旺盛，近年來成為居家擺飾主要的室內觀葉植物，為人們口中的「發財樹」。



各式馬拉巴栗造型盆栽



## 繁殖及栽培

馬拉巴栗生長勢強，對溫度及光線無特殊生育需求，對土質要求亦不嚴，因此容易栽培管理。具有商品價值的馬拉巴栗主要以種子繁殖，種子具多胚性，一顆種子常可獲得1株以上種苗。馬拉巴栗果實開裂後的種子通常1週後即失去發芽率，造成種子長程貯運的限制。因此種子採收後須立刻播下，約2至3天可發芽。苗株生長到需求高度後，依種植者所需的植株高度於田間選苗，以生產30~100公分不同高度的編辮型馬拉巴栗。

馬拉巴栗目前無專門種子生產商，因此農民自行採收成熟果實，取其種子播於田間。果實充實度不均會影響種子品質，造成發芽率低及發芽整齊度不一的問題，導致後續選苗及定植操作不方便。因此需要選別大小齊一的充實種子以提高種子發芽率與成苗率。編辮苗定植時若太淺，易因灌溉或強風而倒伏。定植完畢後應馬上進行灌溉工作，確定根部周圍土壤有充分水分。馬拉巴栗根部可儲藏多量水分，所以後續土壤含水量若過多，易造成根部腐爛使植株死亡，栽培時須注意排水良好，勿種植於低窪地區。



馬拉巴栗果實



馬拉巴栗小苗編



馬拉巴栗種子播於田間



馬拉巴栗設施內苗床



馬拉巴栗自發芽生長至成株編辮苗出貨，皆於營養生長階段。依編辮苗大小不同，生長發育時間也不同。一般來說，90公分~120公分編辮苗約須1年半至2年的生長時間方可採收。編辮型馬拉巴栗正常生長品質為每枝莖幹粗細相同，且整株編辮的交叉點無縫隙，莖幹表皮全為翠綠色，根部無腐爛空心之現象。

### 結語

馬拉巴栗編辮苗商品造型眾多，不僅成功吸引國外消費者的目光，創造可觀的外銷金額，同時也因其「發財樹」好運別名而深受國內社會大眾的喜愛。馬拉巴栗盆景可居家佈置也可戶外栽培，加上照料容易，已成

為主要盆栽之一。繫上紅緞帶十分喜氣，也是過年節慶的祝賀禮之一。臺灣栽培者及業者對於馬拉巴栗編辮苗的用心及創意，是馬拉巴栗產業穩定發展的基石。

### 參考資料

1. 沈榮壽 2005 馬拉巴栗 p877-882臺灣農家要覽增修訂三版 農作(二) 財團法人豐年社。
2. 陳文樹 2011 「庭園盆栽樹種」與「經濟樹種」的馬拉巴栗 臺灣花卉園藝288: 48-51。
3. 黃國棟 2010 馬拉巴栗 p55-59 主要外銷花卉作業手冊第一版 臺灣區花卉輸出業同業公會。



馬拉巴栗大型編辮苗可作庭園景觀佈置