



# 斑文鳥

學名：*Lonchura punctulata* (Swinhoe)

英名：Nutmey mannikin, spotted munia

俗名：黑嘴鵙仔

## 一、前言

斑文鳥為水稻成熟期重要害鳥之一，農民為了防止鳥害，常利用農藥或鳥網，設下陷阱毒殺或網殺隨時來襲的鳥群。近年來由於社會普遍地重視野生動物的保護，因此這種殺害野生鳥類的自衛方式常被認為過度殘忍，而受到指責。如何進一步研究防範害鳥，而保護稻穀的技術，亟待加強。

## 二、危害狀

一隻斑文鳥一日平均可取食稻穀 8.02 克，危害乳熟期至完熟期之稻穀。嘴喙粗短而有力，取食量大且食性較為專一，以禾本科植物之種子為主。

## 三、斑文鳥概述

### (一)分類地位

雀形目 Passeriformes

文鳥科 Ploceidae

### (二)分布

分布於中國、臺灣、印度、新加坡、

馬來西亞、菲律賓、印尼。

### (三)寄主植物

穀類為其主要食物。稻穀未成熟前以昆蟲及其他植物之種子為食物。

### (四)形態

體上面褐灰色。腰及尾上覆羽帶金黃色。腮及喉部赤褐色，胸及體側白色，有黑褐色箭頭狀斑，故名。腹部中央及尾下覆羽白色，嘴灰藍色，呈圓錐形，腳鉛色。體長 12 公分，翼長 52 ~ 54 公釐，尾長 28 ~ 42.5 公釐（圖一）。

### (五)生活史

沒有固定的繁殖期，甚至在寒冷的冬天亦可發現其抱卵與育雛。築巢於離地不高的竹林及矮小灌木中，以乾葉和小草為材料。每巢約有 4 ~ 7 個白色的蛋。

## 四、發生生態

斑文鳥為臺灣常見之留鳥，多分布於低海拔山坡地，出現於農田、草原、竹林和灌林叢中。平時有成群聚集的習性，不論是活動、覓食或繁殖，常結伴而行。有





圖一：斑文鳥。（洪士程）

時在都市近郊或田野間，亦可發現與白腰文鳥或其他外來種文鳥同時出現。嘴喙又粗又短，適宜取食質地較為堅硬的穀物；喜於芒草叢及稻田中覓食，通常成10隻左右之小群活動，但收割季節往往可見數10隻的大群，以種子及稻穀為食，至哺育時期則捕食昆蟲。飛翔時個體間之距離小，遠看有如蜜蜂般成一團移動的黑影，以直

線波浪式前進，並發出柔弱的哨音。

## 五、防治方法

同麻雀之防治法。

## 六、參考文獻

1. 何健鎔。1988。臺灣田間二種鳥類危害之觀察。啟農雜誌 58:54-59。
2. 張萬福。1985。臺灣的陸鳥。禽影圖書有限公司出版。211p。

（作者：洪士程）